Перед применением внимательно прочитать!

Рекомендации по применению препарата

ТОРНАДО® БАУ, ВР

(8,8 г/л глифосата кислоты)
ВОДНЫЙ РАСТВОР

Гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками, готовый к применению

Рекомендуемые нормы расхода и способ применения: препарат готов к применению. Опрыскивание препаратом следует проводить рано утром или поздно вечером. Не рекомендуется опрыскивать перед дождем!

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода препарата л/100 м^2	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения
Плодовые, цитрусовые, виноградники	1	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков в ранние стадии роста (от 5 до 10-15 см высотой) при условии защиты культуры
	2		Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков (высотой от 10-15 см и выше) при условии защиты культуры
	3	Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк полевой, вьюнок полевой, и др.)	Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при условии защиты культуры
Участки, предназначенные под посев (посадку) яровых культур овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых и т.д.	2	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период.
	3	Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк полевой, вьюнок полевой и др.)	
Газоны (новые посевы)	2	Однолетние и многолетние	Опрыскивание вегетирующих сорняков высотой от 5 до 15 см за 10-14 дней до посева газонных трав.
	3	Однолетние и многолетние, в том числе и злостные	
Картофель	1	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры.
Участки, не предназначенные под посев (посадку) культурных растений (садовые дорожки, вдоль изгороди и пр.)	1-2	Однолетние и многолетние, в т. ч. злостные	Опрыскивание вегетирующих сорняков
	2-3	Нежелательная древесно-кустарниковая растительность	

Кратность обработок – 1

Срок выхода для ручных работ – через 15 дней после обработки

Скорость воздействия: через 5 – 30 дней в зависимости от активности роста сорняков и погодных условий в период обработки.

Период защитного действия: в течение вегетационного периода (многолетние сорняки); в течение 20-60 дней и более (однолетние сорняки).

Фитотоксичность: общеистребительный гербицид (к глифосату нет устойчивых культур, кроме трансгенных).

Селективность: общеистребительный препарат.

Возможность возникновения резистентности: за период использования препарата не выявлено.

Совместимость с другими препаратами: не применимо, так как препарат производится в готовой беспропеллентной аэрозольной упаковке.

Класс опасности: 3 - умеренно опасное вещество, 2 класс по стойкости в почве.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: глифосат малотоксичен для рыб; малоподвижен в почве, не является летучим и не может загрязнять атмосферу; рекомендуется к использованию, в том числе - в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Класс опасности для пчел - 3 – мало опасный пестицид; при применении необходимо соблюдать следующие экологические регламенты: проводить обработку растений в утренние или вечерние часы при ветрености до 4-5 м/с;погранично-защитная зона для пчел – не менее 2-3 км; ограничение лета пчел – 3-4 часа.

Первая помощь при отравлении: при попадании препарата на кожу - осторожно, не втирая, снять его ватой или куском марли, тщательно промыть водой с мылом; при попадании препарата в глаза - промыть их мягкой струей чистой проточной воды при разомкнутых веках; при отравлении через дыхательные пути - вывести пострадавшего из зоны действия препарата, сменить одежду, прополоскать рот теплой водой; при ослабленном дыхании – поднести к носу нашатырный спирт, при отсутствии дыхания – проводить искусственное дыхание, обратиться за медицинской помощью;при случайном проглатывании - дать выпить взвесь активированного угля с большим количеством воды (из расчета 1 г сорбента на кг веса), а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту, после чего принять активированный уголь в тех же дозах с небольшим количеством воды. После оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу!

Информация для врача: специфического антидота нет. Лечение симптоматическое.

В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»: 129090 Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.

Меры предосторожности: при работе с препаратом запрещается курить, пить, принимать пищу. Использовать средства индивидуальной защиты. Обработку проводить в отсутствие детей и животных.

Ограничения: При применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», М., 2002 г. Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить. Обработку проводить в отсутствие детей и животных с использованием средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. *Не рекомендуется опрыскивать перед дождем!* Опрыскивание производить в ранние часы (до 10 часов) и вечерние (после 18 часов) часы в безветренную погоду, с использованием средств индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания. Во время опрыскивания для защиты культурных растений целесообразно использовать защитные экраны из фанеры или полиэтилена. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обезвреживание остатков препарата и тары: препарат в случае пролива засыпать песком, землей или любым другим адсорбентом. Освободившиеся флаконы необходимо промыть. Остатки препарата, адсорбционный материал и освободившуюся упаковку утилизировать в специально отведенных местах. Не допускается повторное использование тары.

Условия хранения: хранить отдельно от лекарств и пищевых продуктов, в недоступном для детей и животных месте, при температуре от -5^0 до $+40^0$ С.

Номер государственной регистрации: 1562-09-108-003-0-0-3-1

Регистрационный номер тарной этикетки: 14-2221 (700мл)

ТУ 2387-051-18015953-2005, ГОСТ Р 51247-99

Объем упаковки: 700 мл (флакон с курковым распылителем)
Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.
Дата изготовления: см. на упаковке
Номер партии: см. на транспортной этикетке
Классификационный шифр 9153, номер ООН (UN) 3082
Изготовитель: ЗАО Фирма «Август», Россия, на Филиале ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов». **Адрес:** 429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1.
Регистрант: ЗАО Фирма «Август», Россия
Юридический адрес: 142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д. 3.
Офис: 129515, Москва,ул. Цандера, д. 6, тел./факс**:** (495) 787-84-99
Склад: 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон Силикат, промзона, стр.4., тел. (495)647-07-49
ТОРНАДО®БАУ - зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирмы «Август», Россия.