



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1689 от « 23 » января 2018 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август» ОГРН 1025006038958 (взамен ранее выданного
свидетельства о государственной регистрации от 27 сентября 2017 г. № 1557)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Бункер, ВСК (60 г/л тебуконазола)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 021-02-1689-1

на срок по « 26 » сентября 2027 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



№ 001909

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,4-0,5	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, плесневение семян, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, септориоз	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
0,4	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили		
0,4-0,5		Плесневение семян, септориоз		
0,5		Фузариозная снежная плесень		
0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т	
0,5		Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня		
0,4-0,5		Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян		
0,4	Рожь озимая	Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
0,5		Фузариозная снежная плесень		
0,4	Овес	Пыльная головня, покрытая (твердая) головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (1 года). Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т	
0,5		Красно-бурая пятнистость		
0,4-0,5	Лен-долгунец	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (1 года). Расход рабочей жидкости – 5-8 л/т	

Запрещается применение препарата:

в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом, в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ручных и механизированных работ не регламентируются.

