



Легендарный победитель сорняков

ГЕРБИЦИД

имазетапир, 40 г/л
+ имазамокс, 30 г/л

- Уничтожение многих однолетних злаковых и двудольных сорняков на гибридах рапса* и подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам, и сое
- Длительное воздействие на сорняки
- Отличная дождестойкость, высокая биологическая и экономическая эффективность

ИМ
С
О
М
Д
О

Одиссей – системный гербицид против однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах сои и гибридов подсолнечника и рапса*, устойчивых к имидазолинонам

Препарат выпускается в форме водно-гликолевого раствора.

Гербицид уничтожает многие виды сорняков, в числе которых: амброзия полыннолистная, марь белая, горчица полевая, овсюг полевой, дурнишник (виды), осот желтый, дымянка лекарственная, просо куриное, канатник Теофраста, щетинник (виды), щирица (виды), ярутка полевая, гречишка вьюнковая. Также Одиссей эффективен против растения-паразита заразихи.

Оба активных ингредиента препарата относятся к классу имидазолинонов. Одиссей поглощается корнями и листьями сорняков, передвигается по ксилеме и флоэме, накапливается в точках роста. Препарат обладает высокой почвенной активностью и обеспечивает защиту от новых всходов сорных растений.

Рост чувствительных сорняков останавливается в течение часа после обработки. Через 5 - 7 дней их точки роста обесцвечиваются и буреют, далее наступает хлороз и полная гибель засорителей. Одиссей обеспечивает чистоту посевов в течение всего вегетационного периода.

Для защиты подсолнечника рекомендуется использовать максимальную дозировку препарата – 1 л/га, а в случае высокой засоренности культуры – применять гербицид совместно с ПАВ Галоп®.

Если для приготовления рабочего раствора используется жесткая (Ca^{2+} , Mg^{2+}), или гидрокарбонатная (HCO_3), или щелочная ($\text{pH}>7$) вода, для увеличения эффективности рекомендуется перед заправкой Одиссея добавлять в воду кондиционер Сойлент®, согласно инструкции.

На сое для расширения спектра действия Одиссея возможно его использование в смеси с другими гербицидами.

При строгом соблюдении регламентов применения Одиссей не фитотоксичен для культур. Однако в определенных условиях применение гербицидов этой группы может вызывать обесцвечивание листьев и торможение роста растений культуры. Важно помнить, что у Одиссея есть ограничения по севообороту (см. в мобильном приложении компании «Август» или на сайте avgust.com).



Расход рабочей жидкости, л/га

50 - 300

Упаковка

Канистры по 10 л

Культура	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки применения
Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	0,5 - 1	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2 - 4 листа) и 4 - 5 листьев культуры
Рапс* (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)		Опрыскивание посевов в фазе 2 - 6 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Рапс озимый обрабатывают весной или осенью
Соя		Опрыскивание посевов в фазе 1 - 3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста (до 4 листьев) сорняков

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

* – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре

С нами расти легче

avgust crop protection