

# КОРСАР® КОРСУПЕР



Берет сорняки на abordaj!

**ГЕРБИЦИД**

бентазон, 400 г/л  
+ имазамокс, 25 г/л

- Расширенный спектр действия и увеличенная биологическая эффективность
- Безопасность для культурных растений
- Моментальная остановка роста и развития сорняков
- Удобство в применении

# Корсар® Супер – двухкомпонентный гербицид для борьбы с комплексом сорняков на посевах сои и гороха

Препарат выпускается в форме водорастворимого концентрата.

Среди **двудольных** чувствительны к препарату: амброзия полыннолистная, горец (виды), горчица полевая, дурнишник (виды), дымянка лекарственная, звездчатка средняя, канатник Теофраста, лебеда (виды), марь (виды), осот (виды), подмаренник цепкий, полынь (виды), редька дикая, ромашка (виды), щирица (виды), ярутка полевая и др. Среди однолетних **злаковых**: овсюг полевой, просо обыкновенное, щетинник (виды), лисохвост (виды).

Имазамокс в составе Корсара® Супер поглощается листьями и корнями сорных растений, бентазон проникает в растения в основном через зеленые части, обладает контактным действием. В зависимости от погодных условий видимые признаки угнетения сорняков появляются через 1 – 7 дней после применения, а полная гибель сорных растений наступает через 10 – 14 дней.

Препарат уничтожает чувствительные виды сорняков, попавшие под обработку, сохраняя чистоту посевов вплоть до уборки. Он также проявляет незначительное почвенное действие в отношении чувствительных видов сорных растений.

Корсар® Супер следует применять с адьювантом Галоп®. Если для приготовления рабочего раствора используется жесткая ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ), или гидрокарбонатная ( $\text{HCO}_3^-$ ), или щелочная ( $\text{pH} > 7$ ) вода, для увеличения эффективности рекомендуется перед заправкой Корсара Супер добавлять в воду кондиционер Сойлент, согласно инструкции.

Корсар® Супер не фитотоксичен для культур при соблюдении регламентов применения. Действующие вещества, входящие в состав препарата, быстро метаболизируются в растениях сои и гороха.

Не рекомендуется использовать на одном поле гербициды из класса имидазолинонов чаще, чем один раз в три года.

При использовании препарата важно соблюдать ограничения по севообороту (см. на тарной этикетке, в мобильном приложении компании «Август» или на сайте [avgust.com](http://avgust.com)).

Для расширения спектра действия Корсар® Супер можно применять в смесях с рядом других гербицидов. Нежелательно использовать препарат в смеси с жидкими удобрениями и микроэлементами (медь, железо, цинк и т. д.).



**Расход рабочей жидкости, л/га**

50 – 300

**Упаковка**

Канистры по 10 л

Культура	Норма расхода препарата, л/га	Сорные растения	Способ и сроки обработки
Соя, горох (кроме овощного горошка)	1,2 – 1,6	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1 – 3 настоящих листа) и фазе 1 – 3 настоящих листьев культуры

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust   
crop protection