

РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

калиевая соль малеинового гидразида, 270 г/л

**Сохранит
результаты
труда**



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

Общая информация



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

Общая характеристика

avgust crop protection

Ингибитор прорастания
картофеля и лука
при хранении



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

Общая
характеристика

avgust crop protection

**калиевая соль малеинового
гидразида, 270 г/л**

Препаративная форма
водорастворимый концентрат

Культуры
картофель, лук репчатый

Назначение
регулятор роста растений, ингибитор
прорастания картофеля и лука при
хранении

РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

Преимущества

avgust crop protection

- сохранение высокого качества продукции до срока ее реализации, высокая экономическая отдача от обработки
- хранение без применения специального оборудования и создания специальных условий
- ускорение созревания урожая, что позволяет оптимизировать сроки уборки
- длительный период действия
- остановка прорастания клубней картофеля, оставшихся в поле после уборки, в следующем сезоне, что снимает необходимость в дополнительной обработке гербицидами
- повышение устойчивости картофеля и лука к болезням при хранении

Трафик®

Механизм действия

Действующее вещество абсорбируется листьями и корнями, после чего передвигается по ксилеме и флоэме, ингибирует деление клеток в меристемах. Сохраняет эффективность длительное время. Может через корни попадать в почвенный раствор, где быстро разлагается под влиянием почвенных микроорганизмов



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

Скорость воздействия

**Действие препарата начинается
через 24 ч после обработки**

avgust 
crop protection



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

Период действия

**С момента обработки
до уборки, а затем
при хранении продукции
(до 9 месяцев)**

avgust crop protection



Трафик®

Регламенты применения

Культура	Назначение	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Картофель	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении	12 - 15	Опрыскивание растений За 21 - 25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм)
Лук репчатый (на репку)		9 - 12	Опрыскивание растений за 14 - 21 день до сбора урожая (при полегании не более 50 % растений)

Трафик®

Особенности применения

Для наиболее эффективного поступления препарата в клубни и луковицы обработку растений картофеля и лука репчатого проводят в период активного роста культур. У картофеля около 80 % клубней должны иметь размер не менее 25 мм (за 21 - 25 дней до сбора урожая), у лука репчатого листья должны быть зелеными, с активным тургором, полегание – не более 50 % растений (за 14 - 21 день до уборки).

Не рекомендуется проводить опрыскивание растений при стрессовых условиях (засуха, сильное развитие болезней и повреждение вредителями, обильные осадки, град, ожоги от пестицидов и агрохимикатов)



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Трафик®

Расход рабочей жидкости

300 л/га



Трафик®

Совместимость

Совместим с пестицидами, в том числе с другими регуляторами роста растений, а также с однокомпонентными и комплексными минеральными макро- и микроудобрениями.

Не рекомендуется смешивать Трафик® с фунгицидами на основе флуазинама, меди и препаратами, обладающими сильноокислой или сильнощелочной реакцией



Трафик®

Свидетельство
о регистрации



Для сельскохозяйственного производства:				
Норма применения препарата л/га	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
9-12	Лук репчатый (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая (при полегании – не более 50%). Расход рабочей жидкости – 300 л/га	60(1)
12-15	Картофель	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм). Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Для личных подсобных хозяйств:				
Норма применения препарата	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
90-120 мл/3 л воды	Лук репчатый (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая (при полегании – не более 50%). Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²	60(1)
120-150 мл/3 л воды	Картофель	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм). Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²	

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня, для ручных работ – 7 дней.



С нами расти легче

avgust.com