

ГЕРБИЦИД

Себринг®

метамитрон, 350 г/л
+ этофумезат, 150 г/л

**Эффективен,
селективен,
совместим**

avgust 
crop protection



ГЕРБИЦИД

Себринг®

Общая информация



ГЕРБИЦИД

Себринг®

Общая характеристика

avgust crop protection

Системный гербицид с почвенным действием для борьбы с однолетними двудольными и некоторыми злаковыми сорняками в посевах свеклы и люпина



ГЕРБИЦИД

Себринг®

Общая
характеристика

avgust crop protection

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Культуры
свекла сахарная и столовая, люпин

Спектр действия
однолетние двудольные и некоторые
злаковые сорняки

метамитрон, 350 г/л
+ этофумезат, 150 г/л

ГЕРБИЦИД

Себринг®

Преимущества

avgust crop protection

- высокая селективность к защищаемым культурам
- прекрасная совместимость в баковых смесях другими гербицидами
- применение на люпине белом по вегетации культуры
- отсутствие ограничений в севообороте

Себринг®

Чувствительные сорняки

Злаковые:

- ежовник обыкновенный
- лисохвост мышехвостниковидный
- мятлик однолетний
- овсюг обыкновенный
- щетинник (виды)
- и другие

Двудольные:

- вероника (виды)
- горец (виды)
- дескурайния Софии
- марь (виды)
- паслен черный
- пастушья сумка
- подмаренник цепкий
- ромашка (виды)

- щирица (виды)
- и другие

ГЕРБИЦИД

Себринг®

Механизм действия

Метамитрон блокирует фотосинтез сорных растений.

Этофумезат нарушает синтез жирных кислот



Себринг®

Скорость воздействия

Сорняки погибают в момент прорастания при довсходовом или в течение 10 - 15 дней при после всходовом применении

Видимые симптомы проявляются через 2 - 3 дня после опрыскивания вегетирующих растений



ГЕРБИЦИД

Себринг®

Период защитного
действия

**За счет почвенного
действия гербицид
позволяет сдержать
появление следующей
«волны» сорняков**



Себринг®

Регламенты применения

Культура	Способ и сроки обработки	Норма расхода препарата, л/га
Свекла сахарная, кормовая	Опрыскивание посевов в фазе 1 - 2 листьев культуры	3 - 4
Свекла столовая (кроме пучкового товара)		
Свекла сахарная, кормовая	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой и второй «волне»)	2
Свекла столовая (кроме пучкового товара)		

Себринг®

Регламенты применения

Культура	Способ и сроки обработки	Норма расхода препарата, л/га
Свекла сахарная, кормовая	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой и второй «волне»)	2
Свекла столовая (кроме пучкового товара)		
Люпин	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных и первого листа злаковых) в фазе от 2 до 4 настоящих листьев люпина	2 - 4

Себринг®

Особенности применения

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адъюванта Аллюр®.

Оптимальная температура воздуха для внесения препарата – не ниже 5 и не выше 25 °С. Не рекомендуется опрыскивать посевы, ослабленные воздействием заморозков, жары, вредителей



ГЕРБИЦИД

Себринг®

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

avgust 
crop protection

Себринг® высокоизбирателен для свеклы, поэтому при соблюдении регламентов применения угрозы проявления фитотоксичности не существует.

У люпина при неблагоприятных условиях возможна приостановка роста, краевые ожоги листьев, искривление верхушечных листьев. В течение 2 - 3 недель этот эффект исчезает

ГЕРБИЦИД

Себринг®

Расход рабочей жидкости

200 - 300 л/га



На свекле Себринг® можно использовать в комбинации с гербицидами Бицепс® 300, Трицепс®, Хакер®, Хакер® 300, Питон®, Симба®, а также с граминицидами Квикстеп®, Миура®, Граминион®.

Для опрыскивания посевов свеклы по всходам сорняков рекомендуется баковая смесь препарата совместно с Бицепсом® Гарант или Бицепсом® 22, 1 - 1,5 л/га (в фазе семядолей у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8 - 14 дней при повторном отрастании сорных растений.

На люпине эффективны комбинации с граминицидами Квикстеп®, Миура®, Граминион®

ГЕРБИЦИД

Себринг®

Испытания



ГЕРБИЦИД

Себринг®

Полевой производственный опыт

avgust 
crop protection

**Воронежская область,
ВНИИСС имени А. Л. Мазлумова**

Сорняки:

марь белая, щирица запрокинутая,
ярутка полевая, щетинник сизый,
горец вьюнковый

Норма расхода:

трехкратное применение:
1,3 + 1,5 + 1,5 л/га

ГЕРБИЦИД


Себринг®

Результаты применения

avgust crop protection



Через 18 суток после
третьей обработки



Контроль без обработки
на ту же дату

ГЕРБИЦИД

Себринг®

Полевой производственный опыт

avgust crop protection

**Воронежская область,
ГК «Продимекс», филиал
ПХ «Южный»**

Сорняки:

марь белая, щирица запрокинутая,
ярутка полевая, щетинник сизый, горец
вьюнковый, повилика полевая

Норма расхода:

Себринг, 3 л/га в системе гербицидной
защиты с препаратами на основе
десмедифама, фенмедифама,
трифлусульфурон-метила, клетодима
и хизалофоп-П-этила

ГЕРБИЦИД

Себринг®

Результаты применения

Через 8 суток после обработки



ГЕРБИЦИД

Себринг®

Результаты применения

Новые всходы сорняков через 20 дней



Себринг, 3 л/га



Контроль без обработки

Свидетельство о регистрации

	
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ	
СВИДЕТЕЛЬСТВО	
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА	
№ 4552	от « 3 » мая 2024 г.
Настоящее свидетельство выдано	
АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958	
(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)	
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ	
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»	
пестицид Себринг, СК (350 г/л метамитрона + 150 г/л этофумезата)	
(наименование пестицида или агрохимиката)	
получил государственную регистрацию за № 021-03-4552-1	
на срок по « 2 » мая 2034 г. и допускается к обороту на	
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:	
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов	
	
	
(подпись)	
М. П.	
	
№005099	

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработки)
1	2	3	4	5
3-4	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	Свекла столовая (кроме для пучкового товара)			53(1)
2	Свекла сахарная, кормовая		Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(2)
	Свекла столовая (кроме для пучкового товара)			53(2)
2	Свекла сахарная, кормовая		Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(3)
	Свекла столовая (кроме для пучкового товара)			53(3)
2-4	Люпин		Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазу семядолей двудольных и первого листа злаковых) в фазу от 2 до 4-х настоящих листьев люпина. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, в водоохранной зоне водных объектов и авиационным методом.



Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.



Мобильные приложения



Каталог продукции
для России и Беларуси



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com