



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 3066 от « 19 » марта 2021 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Лазурит Супер, КНЭ (270 г/л метрибузина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 021-03-3066-1

на срок по « 18 » марта 2031 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№003467



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,9 + (0,35-0,55)	Картофель (кроме раннелетнего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(2)
1,0-1,3			Опрыскивание вегетирующих сорных растений при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
0,35+0,75	Томат посевной		Опрыскивание вегетирующих сорных растений последовательно в фазе 1-2 листьев культуры и в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	46(2)
1,1-1,4			Опрыскивания вегетирующих сорных растений в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	46(1)
1,6	Томат рассадный		Опрыскивание вегетирующих сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 500 л/га	

Для личных подсобных хозяйств:

Норма расхода препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
10 мл/3 л воды + 4,5 мл/3 л воды	Картофель (кроме раннелетнего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	60(2)
10 мл/3 л воды			Опрыскивание вегетирующих сорных растений при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	60(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Лазурит Супер, КНЭ (270 г/л метрибузина) от 19 марта 2021 г. № 3066

1	2	3	4	5
5 мл/3 л воды + 10 мл/3 л воды	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений последовательно в фазе 1-2 листьев культуры и в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	46(2)
10-15 мл/3 л воды			Опрыскивания вегетирующих сорных растений в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	46(1)
15 мл/5 л воды	Томат рассадный		Опрыскивание вегетирующих сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м ²	

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения ручных работ в условиях личных подсобных хозяйств – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



