avgust
crop protection

БАЛЕРИНА® СУПЕР

Виртуоз среди мастеров гербицидного дела

ГЕРБИЦИД	сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л + флорасулам, 15 г/л

- Усиленная борьба с широким спектром сорняков на зерновых культурах
- Увеличенные скорость и эффективность действия против проблемных видов (пикульник, бодяк, осот, ромашка и др.)
- Контроль подмаренника до 14 мутовок или до 50 см

Балерина® Супер – противодвудольный гербицид с удвоенной эффективностью против ключевых сорняков в посевах зерновых культур

Препарат выпускается в форме суспензионной эмульсии.

Гербицид уничтожает однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА.

Чувствительны: амброзия полыннолистная, василек синий, галинсога мелкоцветная, горчак (виды), горчица (виды), дескурайния Софии, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, лебеда (виды, семядоли - 2 настоящих листа), мак (виды), осот (виды), пастушья сумка, подмаренник цепкий (до 14 мутовок), подсолнечник (падалица), рапс (падалица), редька дикая, ромашка (виды), сурепица, щирица (виды), ярутка полевая и др. **Среднечувствительны:** аистник цикутовый, вика полевая, горошек (виды), гречиха татарская, конопля сорная, льнянка обыкновенная, пикульник (виды), полынь обыкновенная, портулак огородный, фиалка полевая, череда трехраздельная, чистец однолетний, чистец болотный и др. **Слабочувствительны:** вероника (виды), вьюнок полевой, лютик (виды), молочай (виды), паслен черный и др.

В течение 3 ч после обработки рост чувствительных сорняков останавливается. Через 3 - 4 дня проявляются обесцвечивание и скручивание листьев, сокращение междоузлий. Через 2 - 3 недели сорняки полностью погибают. Гербицид защищает посевы до появления новой «волны» сорняков.

Оптимальное время для обработки однолетних двудольных сорняков – фаза 2 - 6 листьев, многолетних корнеотпрысковых – в фазе розетки - начала стеблевания. Минимальную норму расхода используют на ранних стадиях развития сорняков и в фазе развития подмаренника до 20 см. Максимальную – при высокой засоренности; преобладании подмаренника и в фазе его развития более 20 см; перерастании сорняками уязвимой фазы; в случае неблагоприятных погодных условий в момент обработки. Оптимальная температура – от 8 до 25 °С. Не рекомендуется обработка в те дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них.

Необходимо чередовать использование Балерины® Супер с гербицидами другого механизма действия.

Балерину® Супер можно комбинировать с другими гербицидами, а также с инсектицидами и фунгицидами после проверки препаратов на совместимость. В случае смешивания препарата с граминицидами на основе феноксапроп-П-этила и клодинафоп-пропаргила при неблагоприятных для обработки условиях и особенно по переросшим сорнякам рекомендуется использование максимальных зарегистрированных норм расхода граминицидов.

Расход рабочей жидкости, л/га

50 - 300

Упаковка

Канистры по 5 л

Культура	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Пшеница, ячмень и тритикале озимые и яровые, рожь, овес	0,3 - 0,5	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной
	0,5	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 - 2 междоузлия) культуры. Озимые обрабатывают весной
Кукуруза, в том числе на силос и масло	0,3 - 0,5	Опрыскивание посевов в фазе 3 - 5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков
Просо		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков
Сорго		Опрыскивание посевов в фазе 3 - 6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Необходимо принимать во внимание сортовую чувствительность культуры

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust crop protection

avgust.com ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515. **Т:** (495) 787-08-00, 787-08-20