



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4456 от « 14 » марта 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Бомба, ВДГ (563 г/кг трибенурон-метила + 187 г/кг флорасулама)

(наименование пестицида или агрохимиката)

021-03-4456-1

получил государственную регистрацию за №

13 марта 2034

на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.

№ 004983

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, кг/га 1	Культура 2	Вредный объект 3	Способ, время обработки, особенности применения 4	Срок ожидания (кратность обработок) 5
0,02-0,03 0,02-0,03 (A)	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междуузлия и в ранние фазы роста сорных растений. Препарат может применяться самостоятельно или с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксицата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочего раствора, но не более 300 мл/га). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиаприменении – 25-50 л/га	60 (1)
0,02-0,03 0,02-0,03 (A)	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью от фазы 2-3 листа до конца кущения культуры и в ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксицата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочего раствора, но не более 300 мл/га). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиаприменении – 25-50 л/га	-(1)

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах и в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 2 дня.

