



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4913 от « 25 » июня 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Коллайдер, СК (200 г/л хлорантранилипрола)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 021-01-4913-1

на срок по « 24 » июня 2035 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 005483

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Сроки ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,04-0,06	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200- 400 л/га	21(2)
0,15-0,2		Хлопковая совка		
0,04-0,05	Картофель	Колорадский жук		7(2)
0,1-0,15 0,1-0,15 (А)	Подсолнечник	Луговой мотылёк, подсолнечниковая огневка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га, при авиационном опрыскивании - 25-50 л/га	21(2)
		Озимая совка		
	Кукуруза	Озимая совка	Опрыскивание в период всходов. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 100-200 л/га, при авиационном опрыскивании - 25-50 л/га	
		Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка		
0,15-0,3	Капуста	Капустная моль, капустная совка, капустная тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	7(2)
0,15-0,25	Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, тли, клубеньковые долгоносики		21(2)
0,15-0,25 0,15-0,25 (А)	Соя	Бобовая (акациевая) огневка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: наземном опрыскивании – 200-400 л/га, при авиационном опрыскивании - 25-50 л/га	21(2)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Коллайдер, СК (200 г/л хлорантранилипрола) от 23 июня 2025 г. № 4913

1	2	3	4	5
0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	21(2)
0,15-0,25	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Сроки ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,5-3 мл/10 л воды	Яблоня	Яблонная пло­до­жор­ка, листо­вертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	21(2)
1,5-2,5 мл/10 л воды	Виноград	Гроздевая листо­вертка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	
0,4-0,6 мл/3 л воды	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	
1,5-2 мл/3 л воды		Хлопковая совка		
1,5-3 мл/3 л воды	Капуста	Капустная моль, капустная совка, капустная тля		7(2)
0,4-0,5 мл/3 л воды	Картофель	Колорадский жук		

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов.

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных и ручных работ — 3 дня.

Сроки безопасного выхода пользователей на обработанные пестицидом участки для проведения ручных работ личным подсобном хозяйстве — 3 дня.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

